

経皮的冠動脈形成術(PCI)
経皮的血管形成術(PTA)

ソケイ部穿刺 入院診療計画書 診断群分類

病棟(病室):

疾患名		主治医		栄養士		ID	
		看護師				氏名	
		薬剤師					

	1月1日	1月2日		1月3日	1月4日	
	入院時	検査当日(前)	検査当日(後)	検査後1日目	検査後2日目	
目標	検査の説明が分かる	□不安なく検査が受けられる	□出血、血腫がない □造影剤の副作用がない			
内服	持参薬を確認します 現在内服中のお薬は指示に従ってください	朝分はお薬を飲みます	食事開始後、お薬を飲みます	薬が出ます		
点滴注射		点滴を開始します	尿比重を測定し、正常範囲になれば点滴を抜きます			
検査	採血をします		検査後3時間後に心電図をとります(PCI時) 採血をします	採血をします 9時に心電図、尿検査をします		
観察	検温します(毎日) 心電図モニターをつけます	検温・血圧測定をします			医師の指示で モニターを外します	
処置	医師の指示があれば抗生剤の テストをします	除毛します	検査終了時、もしくは3時間後、足の付け根に入った 管を抜き、その部分を圧迫します 6時間後圧迫テープをはずし 消毒後カットバンを貼ります			
食事	必要に応じて栄養士の訪問が あります 食事ができます	検査の順番によって 異なります 看護師から説明します	検査後は食事ができます			
清潔	入浴できます		入浴・シャワーできません 身体を拭きます			
排泄		尿の管を入れます	ベッドの上で排泄します(お手伝いします)	尿の管を抜いた後はトイレに行けます		
安静	院内自由に歩けます		仰向けで、6時間ベッド上安静が必要です 検査をした方の足は曲げられません 足の付け根に入った管を抜いた後は頭を上げられません	止血確認後、歩くことができます		
説明指導	入院、検査についての 説明があります。			検査の結果、治療方針の説明があります 退院に向けての指導、次回受診説明があります 服薬指導があります 総合評価 □あり □なし		
症状	特別な 栄養管理の 必要性			□あり □なし	日常生活能力	□問題なし □介助が必要な状態です
本人・家族の要望					認知機能	□問題なし □不安定な部分があります
看護計画等					気分・心理状態	□問題なし □不安定な部分があります

本人氏名	
親族又は代理人氏名	続柄:

説明日	西暦 年 月 日	主治医氏名	
-----	----------	-------	--