

経皮的冠動脈形成術(PCI)
 経皮的血管形成術(PTA)
 ソケイ部穿刺 入院診療計画書
 病棟(病室):

疾患名



治療の流れが分かる動画を見ることができます



看護師
 薬剤師
 栄養士

ID
 氏名

| | 月 日 | 1月1日 | | 1月2日 | 1月3日 |
|------|----------------------------------|---|---|--|---------------------|
| | 入院時 | 検査当日(前) | 検査当日(後) | 検査後1日目 | 検査後2日目 |
| 目標 | 検査の説明が分かる | 不安なく検査が受けられる | 出血、血腫がない 造影剤の副作用がない | | |
| 内服 | 持参薬を確認します 現在内服中のお薬は指示に従ってください | 朝分はお薬を飲みます | 食事開始後、お薬を飲みます | 薬が出ます | |
| 点滴注射 | | 点滴を開始します | 尿比重を測定し、正常範囲になれば点滴を抜きます | | |
| 検査 | 採血をします | | 検査後3時間後に心電図をとります(PCI時) 採血をします | 採血をします 9時に心電図、尿検査をします | |
| 観察 | 検温します(毎日) 心電図モニターをつけます | 検温・血圧測定をします | | | 医師の指示で モニターを外します |
| 処置 | 医師の指示があれば抗生剤のテストをします | 除毛します | 検査終了時、もしくは3時間後、足の付け根に入った管を抜き、その部分を圧迫します 6時間後圧迫テープをはずし 消毒後カットバンを貼ります | | |
| 食事 | 必要に応じて栄養士の訪問があります 食事ができます | 検査の順番によって異なります。()食から絶食です 看護師から説明します | 検査後は食事ができます | | |
| 清潔 | 入浴できます | | 入浴・シャワーできません 身体を拭きます | | |
| 排泄 | | 尿の管を入れます | ベッドの上で排泄します(お手伝いします) | 尿の管を抜いた後はトイレに行けます | |
| 安静 | 院内自由に歩けます | | 仰向けで、6時間ベッド上安静が必要です 検査をした方の足は曲げられません 足の付け根に入った管を抜いた後は頭を上げられません | 止血確認後、歩くことができます | |
| 説明指導 | 入院、検査についての説明があります。 | | | 検査の結果、治療方針の説明があります 退院に向けての指導、次回受診説明があります 服薬指導があります | |

| | | |
|----------|--|--|
| 症状 | | 総合評価: 別紙参照 |
| 本人・家族の要望 | | 特別な栄養管理の必要性 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| 看護計画等 | | |

本人氏名
 親族又は代理人氏名 続柄:

説明日 西暦 年 月 日

主治医氏名